

VI
20 JUIN 1953

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
du LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Aveyron, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - TÉL. M2 58-72

1ère Année

27 Mai 1953

N° 12

REMARQUES

EMPLOI DES SOUFRES

Nous rappelons aux cultivateurs que les divers soufres provoquent parfois de graves brûlures aux végétaux sur lesquels ils sont appliqués. Dans la plupart des cas c'est la forte chaleur qui provoque ces accidents.

Sur les arbres fruitiers à pépins il est désormais inutile d'effectuer des traitements contre les tavelures; l'évolution du champignon étant à peu près arrêtée par la chaleur.

MELANGE DE PRODUITS

S'il est parfois très intéressant de mélanger entre eux des produits utilisés pour le traitement antiparasitaire des végétaux afin de réaliser des traitements mixtes, il est par contre certains mélanges qu'il faut absolument proscrire. Certains produits perdent de leur efficacité ou forment par leur combinaison des substances toxiques pour les plantes.

Nous rappelons à nouveau qu'il convient de nous consulter dans chaque cas particulier.

Lorsqu'on effectue un mélange réputé possible, il convient de le réaliser avec des produits provenant du même fabricant.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé
des Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON



Ministère de l'Agriculture

Ecole Nationale d'Agriculture de
MONTPELLIER

STATION REGIONALE
d'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Montpellier, le 26 Mai 1953

M I L D I O U

RETARD DE VEGETATION ET ECHAUDAGE

NOTE N° 4.

I - Mildiou. - D'après les renseignements parvenus à l'Ecole d'Agriculture, ou recueillis sur place, le mildiou existe dans tous les vignobles de l'étang de Marseillette; par ailleurs nous savons qu'il a été constaté depuis le 1^o mai dans les communes d'Agde et de Vias. D'autres foyers isolés peuvent exister ailleurs. Enfin les pluies du 13 au 14 Mai ont provoqué la sortie d'une invasion primaire de mildiou, visible dans la région de St-Gilles, Bellegarde, Fourques, Arles.

Dans ce dernier cas, lorsque les vignes sont dans un état normal de végétation, il y a lieu de poursuivre l'ébourgeonnage qui supprimera les taches primaires des gourmands avant la dissémination par la prochaine pluie des germes qu'elles portent.

Par ailleurs, un traitement cuprique s'impose maintenant d'autant plus vivement que le vignoble auquel il est destiné se trouve plus rapproché des foyers existants, signalés ou non.

II - Retard de végétation. - De très nombreux retards de végétation dûs vraisemblablement aux froids précoces de l'automne, se manifestent dans de nombreux vignobles, depuis Montpellier jusqu'à Béziers et au-delà; bien qu'il y ait peu à faire actuellement, il est logique - toute question de mildiou mise à part - de palisser deux ou trois gourmands par souche, quand il y en a, pour assurer la formation ultérieure du pied et la récolte à venir.

III - Echaudage. - De nombreuses grappes brunies sont signalées dans les vignobles de Mèze, Pouzols, Cazouls-les-Béziers, Castries, etc... sur Terret, Carignan, Grenache, Morrastel-Bouschet, Cinsaut.

Il s'agit la plupart du temps de jeunes plantiers à croissance rapide, ayant souffert des températures élevées du vendredi 22 Mai. C'est un accident et non une maladie parasitaire.

Le Directeur de la Station
Régionale d'Avertissements Viticoles,

G. BERNON.

Reproduction ou adaptation réservées - Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles
16, rue de la République - MONTPELLIER
Autorisation du 23 Janvier 1953 - Le Gérant : R. BERTRAND